

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 470 616 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91113334.6

(51) Int. Cl.⁵: C07D 239/42

(22) Anmeldetag: 08.08.91

(30) Priorität: 10.08.90 DE 4025387

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
12.02.92 Patentblatt 92/07


(34) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 80 03 20
W-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

(72) Erfinder: Geisen, Karl, Dr.
Jahnstrasse 43
W-6000 Frankfurt a.M.(DE)
Erfinder: Utz, Roland, Dr.
Sudetenstrasse 18
W-6101 Messel(DE)
Erfinder: Nimmesgern Hildegard, Dr.
Rauenthaler Weg 32
W-6000 Frankfurt a.M.(DE)
Erfinder: Lang, Hans-Jochen, Dr.
Rüdesheimer Strasse 7
W-6238 Hofheim/Ts.(DE)

(54) Substituierte Pyrimidin-Derivate, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Reagenzien.

(57) Es werden Pyrimidin-Derivate der Formel I



I

worin R¹, R², X und Y die angegebene Bedeutung haben, deren Salze sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung beschrieben. Aufgrund ihrer sorbitakkumulierenden Aktivität eignen sie sich in ihrer Verwendung als Reagenzien für ein vorteilhaftes pharmakologisches Screening Modell bei der Prüfung von Aldose-Reduktase-Inhibitoren.


EP 0 470 616 A2

Bei diabetischen Individuen (Tier, Mensch) kommt es zum Auftreten erhöhter intrazellulärer Sorbit-Konzentrationen. Sorbit wird durch das Enzym Aldose-Reduktase bei erhöhter Blutglukose vermehrt gebildet. Die Sorbitakkumulation kann durch Aldose-Reduktasehemmer verhindert werden.

Das Screening nach Aldose-Reduktase Inhibitoren (ARI) erfolgt an Streptozotocin-diabetischen Ratten. 1 bis 2 Wochen nach Diabetesinduktion mit 60 mg Streptozotocin-Sulfat pro kg/Ratte werden die Tiere im ARI-Screening eingesetzt. Als Maß der Wirksamkeit von Aldose-Reduktase-Inhibitoren dient die Absenkung des erhöhten Sorbitgehalts in Erythrozyten, in Nerven und der Linse 5 - 6 h nach Behandlung mit den zu untersuchenden ARIs.

Streptozotocin ist ein Cancerogen. Applikation von Streptozotocin und Haltung der Tiere nach Applikation (2-3 Tage) müssen daher unter Biohazard-Bedingungen erfolgen. Der während der ersten 2 Tage nach Streptozotocin-Applikation ausgeschiedene Urin muß besonders entsorgt werden, die kontaminierten Boxen müssen speziell gereinigt werden. Streptozotocin wirkt aber nicht nur cancerogen bzw. toxisch auf β -Zellen des Pancreas, es verursacht auch Leber- und Nierenschäden. Deshalb werden die Tiere erst 10 - 14 Tage nach Applikation im ARI-Screening eingesetzt.

Die Verwendung von Pyrimidin-Derivaten der Formel I'



I'

in welcher

R¹, R⁴ und R⁵


gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, Trifluormethyl, (C₁-C₆)-Alkyl, (C₁-C₆)-Hydroxyalkyl, (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₆-C₁₂)-Aryl oder Amino bedeuten,

R², R³

gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, (C₁-C₆)-Alkyl, (C₆-C₁₂)-Aryl oder (C₆-C₁₂)-Aralkyl mit 1-4 Alkylkohlenstoffatomen sind, oder R² und R³ bilden zusammen mit dem Stickstoff, an den sie gebunden sind, die Azetidino-, Pyrrolidino-, Piperidino-, Piperazino- oder Morpholinogruppe, oder eine mit gleichen oder verschiedenen Gruppen R⁶ und R⁷ substituierte Azetidino-, Pyrrolidino-, Piperidino-, Piperazino- oder Morpholinogruppe, wobei R⁶, R⁷ (C₁-C₆)-Alkyl, Sulfamoyl, N-(C₁-C₄)-Alkylsulfamoyl, N,N-(C₁-C₄)-Dialkylsulfamoyl, (C₁-C₆)-Alkoxy-carbonyl, N,N-(C₁-C₄)-Dialkylcarbamoyl, N-(C₁-C₄)-Alkylcarbamoyl, N-(C₆-C₁₂)-Arylcarbamoyl, im Arylrest mit (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy, Halogen, NO₂, NH₂, CN oder CF₃ substituiertes (C₆-C₁₂)-Arylcarbamoyl, Carbamoyl,


(C₁-C₆)-Alkylcarbonyl, (C₆-C₁₂)-Arylcarbonyl, im Arylrest mit (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy, Halogen NO₂, NH₂, CN oder CF₃ substituiertes (C₆-C₁₂)-Arylcarbonyl, (C₁-C₆)-Alkylsulfonyl, (C₁-C₆)-Alkylsulfinyl, (C₆-C₁₂)-Arylsulfonyl, im Arylrest mit (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy, Halogen, NO₂, NH₂, CN oder CF₃ substituiertes (C₆-C₁₂)-Arylsulfonyl, Heteroarylcarbonyl oder Heteroarylsulfonyl bedeuten oder einer der Substituenten R⁶, R⁷ Wasserstoff ist, sowie von deren physiologisch verträglichen Salzen als Tool wurde bereits vorgeschlagen (vergl. Deutsche Offenlegungsschrift 39 05 364 entsprechend EP-A-O 384 370 bzw. U.S. Patentanmeldung Nr. 07/482053). Entsprechend den Angaben in dieser Patentanmeldung verursachen dort beschriebene Verbindungen ohne Einfluß auf die Blutglukose akut und chronisch, oral oder parenteral an normale, nicht diabetische Ratten verabreicht einen intrazellulären Sorbitanstieg, der durch simultane Behandlung mit Aldose-Reductase-Inhibitoren verhindert werden kann.

Es wurde nun überraschenderweise gefunden, daß die in der deutschen Offenlegungsschrift 39 05 364 nicht expressis verbis genannten Pyrimidin-Derivate der Formel I



und deren pharmakologisch verträgliche Salze wesentlich günstigere Eigenschaften besitzen. Sie verursachen ohne Einfluß auf die Blutglukose akut und chronisch, oral oder parenteral verabreicht einen intrazellulären Sorbitanstieg. Der durch die Pyrimidin-Derivate der Formel I induzierte Sorbitanstieg wird durch simultane Behandlung mit Aldose-Reduktase-Inhibitoren verhindert. Die Sorbit-akkumulierenden Pyrimidin-Derivate der Formel I eignen sich daher für ein neues, vereinfachtes, weniger kosten- und zeitaufwendiges Akut-Screening nach Aldose-Reduktase-Inhibitoren an normalen, nicht diabetischen Ratten. Im Gegensatz zu den in der deutschen Patentanmeldung genannten Beispielen zeigen die Verbindungen der obigen Formel I in vivo außer an der Ratte auch an anderen Spezies eine Sorbit-akkumulierende Wirkung. Ein ganz erheblicher, nicht zu erwartender Vorteil besteht darin, daß Verbindungen der Formel I nicht nur in vivo sondern auch in vitro, Z.B. an Erythrocyten, Sorbitolerhöhungen induzieren und somit ein noch kostengünstigeres und leichter durchführbares Testmodell für z.B. Aldose-Reduktasehemmer realisierbar ist.


Die vorliegende Erfindung betrifft daher Pyrimidin-Derivate der Formel I



worin

R¹ Wasserstoff oder Methyl ist

R² C₁-C₆-Alkyl, C₅-C₇-Cycloalkyl, unsubstituiertes Phenyl, mit Methyl, Chlor, Fluor, Trifluormethyl, Methoxy, CH₃-SO_n mit n gleich null, 1 oder 2, oder -SO₂-NH₂ mono- oder disubstituiertes Phenyl, wobei im Falle der Disubstitution die Substituenten gleich oder verschieden sind,



wobei R³ und R⁴ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff oder C₁-C₆-Alkyl bedeuten, oder Pyridyl bedeutet oder, falls X ein C-Atom ist, auch Wasserstoff darstellt,

X ein Kohlenstoffatom oder SO ist und

Y Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, Benzyl, Acetyl oder Benzoyl ist, sowie deren physiologisch verträgliche Salze.

Die unter Y und R² der Formel I bezeichneten Alkylreste können geradkettig oder verzweigt sein.

Bevorzugt sind Pyrimidin-Derivate der Formel I, worin

a)


R¹ Wasserstoff ist,

R² C₁-C₃-Alkyl, unsubstituiertes Phenyl oder mono- oder disubstituiertes Phenyl, wobei die Substituenten die angegebenen Bedeutungen haben, darstellt und

X und Y die angegebenen Bedeutungen haben,

b)

R¹ Wasserstoff ist



wobei R³ und R⁴ gleich oder verschieden sind und Methyl oder Ethyl bedeuten, darstellt,

X SO bedeutet und

Y die angegebene Bedeutung hat,

c)

R¹ Wasserstoff ist,

R² Pyridyl darstellt,


X ein Kohlenstoffatom bedeutet und

Y die angegebenen Bedeutung hat

sowie deren physiologisch verträgliche Salze.

Vorzugsweise haben R¹, R² und X die unter a) bis c) angegebenen Bedeutungen und Y steht für ein Wasserstoffatom.


Ganz besonders bevorzugt ist das Pyrimidin-Derivat der Formel I worin R¹ Wasserstoff,




X SO und Y Wasserstoff bedeuten, sowie die physiologisch verträglichen Salze dieser Verbindung.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man in an sich bekannter Weise


a) eine Verbindung der Formel II



worin R¹ die zur Formel I angegebene Bedeutung hat und R⁵ eine geeignete Ätherschutzgruppe, wie Methyl oder Benzyl, bedeutet, oder deren Säureadditionssalz, mit einer Verbindung der Formel III




worin R⁶ Methyl oder Ethyl bedeutet, oder einem ihrer Alkalisalze, zu einer Verbindung der Formel IV



IV


worin R¹ die zu Formel I und R⁵ die zu Formel II angegebenen Bedeutungen haben, umgesetzt, eine erhaltene Verbindung der Formel IV mit einem anorganischen Säurechlorid, wie z.B. mit Phosphoroxychlorid, in ein Pyrimidin-Derivat der Formel V



V


in welcher die Reste R¹ die zu Formel I und R⁵ die zu Formel II angegebene Bedeutung haben, überführt, und anschließend

a) eine erhaltene Verbindung der Formel V mit einem Piperazin-Derivat der Formel VI



VI


worin R² und X die zu Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, zu einer Verbindung der Formel VII



VII


worin R¹, R² und X die zu Formel I und R⁵ die zu Formel II angegebene Bedeutung besitzen, umgesetzt oder

β) eine erhaltene Verbindung der Formel V mit unsubstituiertem Piperazin in eine Verbindung der Formel VIII




VIII

worin R¹ die zu Formel I, und R⁵ die zu Formel II angegebene Bedeutung besitzen, überführt und die erhaltene Verbindung VIII mit einem Säurechlorid der Formel IX




IX

worin R² und X die zu Formel I angegebene Bedeutung besitzen, in eine Verbindung der Formel VII mit den angegebenen Bedeutungen der Substituenten überführt, und eine nach α) oder β) erhaltene Verbindung der Formel VII gegebenenfalls in an sich bekannter Weise durch ätherspaltendes Reagenz, beispielsweise mit BBr₃, Trimethylsilyljodid, oder durch katalytische Hydrierung, wenn R⁵ in der Bedeutung von Benzyl steht, in eine Verbindung der Formel I überführt,
b) eine Verbindung der Formel X



X

worin R¹, R² und X die zu Formel I angegebenen Bedeutungen haben, mit einem Halogenierungsmittel, wie Chlor, Brom, N-Bromsuccinimid, Sulfurylchlorid oder mit Trichlorisocyanursäure, in an sich bekannter Weise in eine Verbindung der Formel XI



XI

worin die Substituenten R¹, R² und X die zu Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für Cl

oder Br steht, überführt, und eine erhaltene Verbindung der Formel XI entweder durch direkte Hydrolyse oder durch Reaktion mit einem Alkalisalz der Essig- oder Benzoesäure z.B. Natriumacetat oder Natriumbenzoat, oder dem Alkalisalz des Benzylalkohols oder dem Alkalisalz eines C₁-C₅-Alkylalkohols in eine Verbindung der Formel I überführt mit R¹, R², X und Y in den angegebenen Bedeutungen und gegebenenfalls eine nach Verfahren a) oder b) erhaltene Verbindung der Formel I mit Y ungleich Wasserstoff in an sich bekannter Weise durch saure oder alkalische Hydrolyse in eine Verbindung der Formel I mit Y gleich Wasserstoff überführt, gegebenenfalls eine erhaltene Verbindung der Formel I mit Y gleich Wasserstoff in an sich bekannter Weise in eine Verbindung der Formel I mit Y gleich C₁-C₅-Alkyl, Benzyl, Acetyl oder Benzoyl überführt und gegebenenfalls eine erhaltene Verbindung der Formel I in ein physiologisch verträgliches Salz überführt.

Falls in Verbindungen der Formel VII R⁵ Methyl oder Benzyl ist, stellen diese Verbindungen Endprodukte der Formel I mit Y gleich Methyl oder Benzyl dar. Diese Verbindungen werden gegebenenfalls den weiteren Reaktionen unterworfen.

Verbindungen der Formel VIII können in an sich bekannter Weise auch durch saure oder alkalische Hydrolyse der Verbindungen VII erhalten werden.

Die Überführung von Verbindungen der Formel I mit Y gleich Wasserstoff in solche mit Y ungleich Wasserstoff erfolgt, z.B. durch direkte Acylierung bzw. durch Umsetzung mit Thionylchlorid über die Verbindungen der Formel XI.

Das erfindungsgemäße Verfahren a) wird analog den in der Literatur beschriebenen Verfahren durchgeführt (vgl. z.B. D. J. Brown, The Chemistry of Heterocyclic Compounds, The Pyrimidines Suppl. I (1970) Suppl. II (1985), Wiley Interscience, N.Y. und darin zitierte Literatur).

Die Seitenkettenchlorierung des erfindungsgemäßen Verfahrens b) wird vorzugsweise mit Trichlorisocyanursäure analog den Angaben von G. E. Jeromin et al.,

Seitenkettenchlorierungen von N-Heterocyclen mit Trichlorcyanursäure (TCC) in Chem. Ber. 120, 649-651 (1987) durchgeführt.

Verbindungen der allgemeinen Formel I können durch Umsetzung mit Säuren in ihre physiologisch verträglichen Salze übergeführt werden.

Bislang mußten zur Untersuchung von Verbindungen mit Wirkung auf diabetische Spätschäden, beispielsweise von Aldose-Reduktasehemmern, diabetische Tiere verwendet werden. In diesen Tieren mußte eine künstliche diabetische Erkrankung durch Zerstörung der insulinsezernierenden β -Zellen mit toxischen Verbindungen, wie Streptozotocin, Alloxan usw., provoziert werden. Die irreversibel geschädigten Tiere, die - wie eingangs beschrieben - erhöhte Blutglucose- und intrazelluläre Sorbit Spiegel entwickeln, sind infolge ihrer diabetischen Erkrankung nur mit aufwendigeren und kostenintensiveren Pflegemaßnahmen zu halten und wegen ihrer Schwächung nur schwierig von sekundären Erkrankungen, die wiederum ihre Verwendbarkeit beeinträchtigen, freizuhalten.

Es war nun überraschend, daß die erfindungsgemäßen Verbindungen, die sich durch gute Verträglichkeit auszeichnen, in gesunden Tieren durch eine intrazelluläre Polyol-Akkumulation ohne vorausgehende diabetische Stoffwechsellaage funktionelle Symptome im Sinne einer diabetischen Neuropathie erzeugen.

Aufgrund dieser Fähigkeit, eine Sorbit-Akkumulation zu bewirken, eignen sich die erfindungsgemäßen Verbindungen in vorteilhafter Weise als Reagenzien zur Prüfung von Aldose-Reduktasehemmern im pharmakologischen Modell an gesunden Tieren. Ferner eignen sich die Verbindungen der Formel I als in vitro-Reagenz für Aldose-Reduktasehemmer. Die Erfindung betrifft daher auch diese Verwendung der Pyrimidinderivate der Formel I und von deren pharmakologisch verträglichen Salzen.


In Dosen von 5 - 50 mg/kg Ratte oral verabreicht, verursachten die Verbindungen gemäß der vorliegenden Erfindung einen von der Dosis abhängigen Anstieg der Sorbitkonzentration im Ischiadicus-Nerv und in den Erythrocyten normaler und Streptozotocin-diabetischer Ratten innerhalb von 4 bis 5 Stunden.


Nach oraler Verabreichung von 25 mg/kg Ratte der Verbindung gemäß Beispiel 1 oder 2 wird nach 4 - 5 Stunden bei normalen Ratten eine Sorbitkonzentration in den genannten Geweben erreicht, die derjenigen entspricht, welche Streptozotocin-diabetische Ratten nach 8 Tagen aufweisen. Durch simultane orale Behandlung mit dem ARI Spiro-2,7-difluor-9H-fluoren-9,4-imidazolidin-2,5-dion (= HOE 843) wird der Sorbitanstieg dosisabhängig verhindert.

Außer den in den Beispielen aufgeführten Verbindungen können die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Verbindungen der allgemeinen Formel I bzw. deren Salze hergestellt werden.


Verwendete Abkürzungen: Methyl (Me), Ethyl (Et), Propyl (Prop), Butyl (Bu), Hexyl (Hex), Acetyl (Ac), Phenyl (Ph), Benzoyl (Bz) iso (i) und cyclo (c).

Tabelle








R ¹	R ²	X	Y
Me	NMe ₂	SO	H
Me	Ph	C	H
H	NMe ₂	SO	Ac
H	NMe ₂	SO	Bz
H	NMe ₂	SO	Ph-CH ₂
H	NEt ₂	SO	H
H	NEt ₂	SO	Me
H	NEt ₂	SO	Ac
H	NBu ₂	SO	H
H	NH ₂	SO	H
H	NH ₂	SO	Ac
H	Me	SO	H
H	Me	SO	Ac
H	Me	SO	Me
H	Et	SO	H
H	Prop	SO	H
H	iProp	SO	H
H	Ph	SO	H
H		SO	H

Tab 11




R ¹	R ²	X	Y
H		SO	H
H		SO	H
H		SO	H
H		SO	H
H		SO	H
H	H	C	H
H	Me	C	H
H	Me	C	Me
H	Me	C	Ac
H	Prop	C	H
H	cHex	C	H
H	Ph	C	H
H		C	H
H		C	H
H		C	H

Fortsetzung der Tabelle

5	R^1	R^2	X	Y
10	H		C	H
15	H		C	H
20	H		C	H
25	H		C	H
25	H		C	H

Beispiel 1

4-[4-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-piperazino]-2-methyloxymethyl-pyrimidin-hydrochlorid



a) 4-Hydroxy-2-methyloxymethyl-pyrimidin

Unter einer Argonatmosphäre werden 31,5 g (0,72 mol) Natriumhydrid in 690 ml Diisopropylether suspendiert und bei Zimmertemperatur wird eine Mischung von 84,5 ml Ameisensäureethylester und 63,4 ml Essigester zugetropft. Man erwärmt vorsichtig auf 40-44 °C. Nach der dabei einsetzenden starken Wasserstoffentwicklung rührt man noch 5 h unter Feuchtigkeitsausschluß nach. Man saugt den Feststoff ab (96 g), löst das rohe Natriumalz des Formylessigesters in 350 ml Wasser und versetzt mit 96 g (770 mmol) Methoxyacetamin-hydrochlorid (vergl. Chem. Abstr. 66, 37942 x (1967)) gelöst in 350 ml Wasser. Nach 3 tägigem Stehen bei Zimmertemperatur wird mit Salzsäure neutral gestellt, der Ansatz i. Vak. zur Trockne eingedampft und mehrmals mit Essigester ausgekocht. Man erhält nach Abdampfen des Lösungsmittels 62,5 g Produkt, das ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt wird.

b) 4-Chlor-2-methyloxymethyl-pyrimidin

47 g (335,7 mmol) 4-Hydroxy-2-methoxymethyl-pyrimidin (aus Stufe a) werden mit 210 ml Phosphoroxchlorid vermischt und 2 h bei 70 °C gerührt, anschließend wird noch 2,5 h zum Sieden erhitzt. Man destilliert das überschüssige Phosphoroxchlorid i. Vak. ab, hydrolysiert den Rückstand mit Eis und gibt zur Beseitigung überschüssiger Säure festes Kaliumhydrogencarbonat zu. Man extrahiert mehrmals mit Methylenchlorid und dampft die organische Phase i. Vak. ein. Den schwarzen Rückstand filtriert man über Kieselgel (n-Heptan/Essigester 1:1). Man erhält 15,7 g Öl.

¹H-NMR (60 MHz/DMSO): δ = 8,82 (d, J = 5Hz, 1H); δ = 7,67 (d, J = 5Hz, 1H); δ = 4,57 (s, 2H); δ

= 3,38 (s, 1H)

c) 4-[4-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-piperazino]-2-methyloxymethyl-pyrimidin-hydrochlorid

3,70 g (23,3 mmol) 4-Chlor-2-methyloxymethyl-pyrimidin, (aus Stufe b) 4,75 g (24,6 mmol) N,N-Dimethylsulfamoyl-piperazin und 3,4 ml Triethylamin werden in 15,4 ml trockenem Tetrahydrofuran 7 Stunden am Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen des Reaktionsansatzes auf Zimmertemperatur wird vom ausgefallenen Triethylammoniumhydrochlorid abgesaugt, mit Essigester nachgewaschen und das Filtrat i. Vak. eingedampft. Das verbleibende Rohprodukt wird über Kieselgel chromatographiert (Essigester/Methanol 9:1). Man erhält 5,90 g öliges Produkt.

¹H-NMR (270 MHz/CDCI₃): δ = 8,28 (d, J=6Hz, 1H); δ = 6,41 (d, J=6Hz, 1H); δ = 4,48 (s, 2H); δ = 3,75 (t, J=5Hz, 4H); δ = 3,33 (t, J = 5Hz, 4H); δ = 2,86 (s, 6H)


Zur Darstellung des Hydrochlorids werden 5,90 g Öl in 25 ml 2 normaler ethanolischer Salzsäure gelöst und das Lösungsmittel i. Vak. abgedampft. Den Rückstand verreibt man mit Aceton und saugt den Feststoff ab, der bei 40 °C im Hochvakuum getrocknet wird.

Es werden 4,1 g Hydrochlorid vom Smp. 174-175 °C erhalten.

C ₁₂ H ₂₂ Cl N ₅ O ₃ S (351,87) Ber.:	C 40,96	H 6,3	N 19,91
Gef.:	C 41,1	H 6,2	N 20,0

Beispiel 2

4-[4-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-piperazino]-2-hydroxymethyl-pyrimidin



11,0 g (35 mmol)


4-[4-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-piperazino]-2-methyloxymethyl-pyrimidin (Beispiel 1) werden in 45 ml trockenem Methylenchlorid gelöst. Zwischen 0 ° bis + 5 °C werden 13,2 g (52,5 mmol) Bortribromid gelöst in 25 ml Methylenchlorid unter Argon langsam zugetropft. Man rührt 1,5 h unter Eiskühlung nach und hydrolysiert mit kalter 2 N Natronlauge. Man trennt die organische Phase ab und extrahiert die wässrige Phase noch 3 mal mit Methylenchlorid. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter Ammoniumchloridlösung, Wasser und gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel wird i. Vak. entfernt. Nach Kristallisation des Rückstandes in Butylacetat erhält man 7,60 g festes Produkt vom Smp. 148-149 °C.

C ₁₁ H ₁₉ N ₅ O ₃ S (301,38): Ber.:	C 43,84	H 6,35	N 23,24
Gef.:	C 43,7	H 6,4	N 21,1

¹H-NMR (60 MHz/DMSO): δ = 8,23 (d, J = 6Hz, 1H); δ = 6,75 (d, J=6Hz, 1H); δ = 4,82 (t, J=5Hz, 1H); δ = 3,73 (m, 4H); δ = 3,27 (m, 4H); δ = 2,78 (s, 6H).


Patentansprüche

1. Pyrimidin-Derivate der Formel I



worin

- R¹ Wasserstoff oder Methyl ist
 R² C₁-C₆-Alkyl, C₅-C₇-Cycloalkyl, unsubstituiertes Phenyl, mit Methyl, Chlor, Fluor, Trifluormethyl, Methoxy, CH₃-SO_n mit n gleich null, 1 oder 2, oder -SO₂-NH₂ mono- oder disubstituiertes Phenyl, wobei im Falle der Disubstitution die Substituenten gleich oder verschieden sind,



wobei R³ und R⁴ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff oder C₁-C₆-Alkyl bedeuten, oder Pyridyl bedeutet oder, falls X ein C-Atom ist, auch Wasserstoff darstellt,

X ein Kohlenstoffatom oder SO ist und

Y Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, Benzyl, Acetyl oder Benzoyl ist,

sowie deren physiologisch verträgliche Salze.

2. Pyrimidin-Derivate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel I


R¹ Wasserstoff ist,

R² C₁-C₃-Alkyl, unsubstituiertes Phenyl oder mono- oder disubstituiertes Phenyl, wobei die Substituenten die angegebenen Bedeutungen haben, darstellt und

X und Y die angegebenen Bedeutungen haben.

3. Pyrimidin-Derivate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel I

R¹ Wasserstoff ist



wobei R³ und R⁴ gleich oder verschieden sind und Methyl oder Ethyl bedeuten, darstellt,

X SO bedeutet und

Y die angegebene Bedeutung hat.

4. Pyrimidin-Derivate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel I

R¹ Wasserstoff ist,


R² Pyridyl darstellt,

X ein Kohlenstoffatom bedeutet und

Y die angegebenen Bedeutung hat


5. Pyrimidin-Derivate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel I Y für ein Wasserstoffatom steht.

6. Pyrimidin-Derivat der in Anspruch 1 angegebenen Formel I worin R¹ Wasserstoff,




X SO und Y Wasserstoff bedeuten, sowie die physiologisch verträglichen Salze dieser Verbindung.


7. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man in an sich bekannter Weise
a) eine Verbindung der Formel II




worin R¹ die zur Formel I angegebene Bedeutung hat und R⁵ eine geeignete Ätherschutzgruppe bedeutet, oder deren Säureadditionssalz, mit einer Verbindung der Formel III



worin R⁶ Methyl oder Ethyl bedeutet, oder einem ihrer Alkalisalze, zu einer Verbindung der Formel IV




worin R¹ die zu Formel I und R⁵ die zu Formel II angegebenen Bedeutungen haben, umsetzt, eine erhaltene Verbindung der Formel IV mit einem anorganischen Säurechlorid in ein Pyrimidin-Derivat der Formel V




in welcher die Reste R¹ die zu Formel I und R⁵ die zu Formel II angegebene Bedeutung haben,

überführt,
und anschließend

α) eine erhaltene Verbindung der Formel V mit einem Piperazin-Derivat der Formel VI




worin R² und X die zu Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, zu einer Verbindung der Formel VII



worin R¹, R² und X die zu Formel I und R⁵ die zu Formel II angegebene Bedeutung besitzen, umgesetzt oder

β) eine erhaltene Verbindung der Formel V mit unsubstituiertem Piperazin in eine Verbindung der Formel VIII




worin R¹ die zu Formel I, und R⁵ die zu Formel II angegebene Bedeutung besitzen, überführt und die erhaltene Verbindung VIII mit einem Säurechlorid der Formel IX




worin R² und X die zu Formel I angegebene Bedeutung besitzen, in eine Verbindung der Formel VII mit den angegebenen Bedeutungen der Substituenten überführt, und eine nach α) oder β) erhaltene Verbindung der Formel VII gegebenenfalls in an sich bekannter Weise durch ätherspaltes Reagenz, oder durch katalytische Hydrierung, wenn R⁵ in der Bedeutung von Benzyl steht, in eine Verbindung der Formel I überführt,

b) eine Verbindung der Formel X



15 worin R¹, R² und X die zu Formel I angegebenen Bedeutungen haben,
mit einem Halogenierungsmittel in an sich bekannter Weise in eine Verbindung der Formel XI




30 worin die Substituenten R¹, R² und X die zu Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für
Cl oder Br steht, überführt, und eine erhaltene Verbindung der Formel XI entweder durch direkte
Hydrolyse oder durch Reaktion mit einem Alkalisalz der Essig- oder Benzoesäure oder dem
Alkalisalz des Benzylalkohols oder dem Alkalisalz eines C₁-C₆-Alkylalkohols in eine Verbindung der
Formel I überführt mit R¹, R², X und Y in den angegebenen Bedeutungen und gegebenenfalls eine
35 nach Verfahren a) oder b) erhaltenen Verbindung der Formel I mit Y ungleich Wasserstoff in an sich
bekannter Weise durch saure oder alkalische Hydrolyse in eine Verbindung der Formel I mit Y
gleich Wasserstoff überführt, gegebenenfalls eine erhaltene Verbindung der Formel I mit Y gleich
Wasserstoff in an sich bekannter Weise in eine Verbindung der Formel I mit Y gleich C₁-C₆-Alkyl,
Benzyl, Acetyl oder Benzoyl überführt und gegebenenfalls eine erhaltene Verbindung der Formel I in
ein physiologisch verträgliches Salz überführt.

40 8. Verwendung von Verbindungen gemäß Anspruch 1 als Reagenz.

Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat: ES

45 1. Verfahren zur Herstellung von Pyrimidin-Derivaten der Formel I




I

15 worin

R¹ Wasserstoff oder Methyl ist

R² C₁-C₆-Alkyl, C₅-C₇-Cycloalkyl, unsubstituiertes Phenyl, mit Methyl, Chlor, Fluor, Trifluormethyl, Methoxy, CH₃-SO_n mit n gleich null, 1 oder 2, oder -SO₂-NH₂ mono- oder disubstituiertes Phenyl, wobei im Falle der Disubstitution die Substituenten gleich oder verschieden sind,




wobei R³ und R⁴ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff oder C₁-C₆-Alkyl bedeuten, oder Pyridyl bedeutet oder, falls X ein C-Atom ist, auch Wasserstoff darstellt,

X ein Kohlenstoffatom oder SO ist und

Y Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, Benzyl, Acetyl oder Benzoyl ist,


sowie von deren physiologisch verträglichen Salzen, dadurch gekennzeichnet, daß man

a) eine Verbindung der Formel II




II

worin R¹ die zur Formel I angegebene Bedeutung hat und R⁵ eine geeignete Ätherschutzgruppe bedeutet, oder deren Säureadditionssalz, mit einer Verbindung der Formel III




III

worin R⁶ Methyl oder Ethyl bedeutet, oder einem ihrer Alkalisalze, zu einer Verbindung der Formel IV



IV

worin R¹ die zu Formel I und R⁵ die zu Formel II angegebenen Bedeutungen haben, umgesetzt, eine erhaltene Verbindung der Formel IV mit einem anorganischen Säurechlorid in ein Pyrimidin-Derivat der Formel V




V

in welcher die Reste R¹ die zu Formel I und R⁵ die zu Formel II angegebene Bedeutung haben, überführt,


und anschließend

α) eine erhaltene Verbindung der Formel V mit einem Piperazin-Derivat der Formel VI



VI


worin R² und X die zu Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, zu einer Verbindung der Formel VII



VII


worin R¹, R² und X die zu Formel I und R⁵ die zu Formel II angegebene Bedeutung besitzen, umgesetzt oder

β) eine erhaltene Verbindung der Formel V mit unsubstituiertem Piperazin in eine Verbindung der Formel VIII



VIII


worin R^1 die zu Formel I, und R^5 die zu Formel II angegebene Bedeutung besitzen, überführt und die erhaltene Verbindung VIII mit einem Säurechlorid der Formel IX



IX


worin R^2 und X die zu Formel I angegebene Bedeutung besitzen, in eine Verbindung der Formel VII mit den angegebenen Bedeutungen der Substituenten überführt, und eine nach α) oder β) erhaltene Verbindung der Formel VII gegebenenfalls in an sich bekannter Weise durch ätherspaltesendes Reagenz, oder durch katalytische Hydrierung, wenn R^5 in der Bedeutung von Benzyl steht, in eine Verbindung der Formel I überführt,

b) eine Verbindung der Formel X



X

worin R^1 , R^2 und X die zu Formel I angegebenen Bedeutungen haben, mit einem Halogenierungsmittel in eine Verbindung der Formel XI




XI

worin die Substituenten R^1 , R^2 und X die zu Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für

Cl oder Br steht, überführt, und eine erhaltene Verbindung der Formel XI entweder durch direkte Hydrolyse oder durch Reaktion mit einem Alkalisalz der Essig- oder Benzoesäure oder dem Alkalisalz des Benzylalkohols oder dem Alkalisalz eines C₁-C₆-Alkylalkohols in eine Verbindung der Formel I überführt mit R¹, R², X und Y in den angegebenen Bedeutungen und gegebenenfalls eine nach Verfahren a) oder b) erhaltenen Verbindung der Formel I mit Y ungleich Wasserstoff in an sich bekannter Weise durch saure oder alkalische Hydrolyse in eine Verbindung der Formel I mit Y gleich Wasserstoff überführt, gegebenenfalls eine erhaltene Verbindung der Formel I mit Y gleich Wasserstoff in an sich bekannter Weise in eine Verbindung der Formel I mit Y gleich C₁-C₆-Alkyl, Benzyl, Acetyl oder Benzoyl überführt und gegebenenfalls eine erhaltene Verbindung der Formel I in ein physiologisch verträgliches Salz überführt.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel I, worin
- R¹ Wasserstoff ist,
 R² C₁-C₃-Alkyl, unsubstituiertes Phenyl oder mono- oder disubstituiertes Phenyl, wobei die Substituenten die angegebenen Bedeutungen haben, darstellt und
 X und Y die angegebenen Bedeutungen haben,
 oder deren physiologisch verträgliche Salze herstellt.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel I, worin
- R¹ Wasserstoff ist




wobei R³ und R⁴ gleich oder verschieden sind und Methyl oder Ethyl bedeuten, darstellt,
 X SO bedeutet und
 Y die angegebene Bedeutung hat, oder deren physiologisch verträgliche Salze herstellt.

4. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel I, worin
- R¹ Wasserstoff ist,
 R² Pyridyl darstellt,
 X ein Kohlenstoffatom bedeutet und
 Y die angegebenen Bedeutung hat,
 oder deren physiologisch verträgliche Salze herstellt.

5. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel I, worin Y für ein Wasserstoffatom steht, oder deren physiologisch verträgliche Salze herstellt.

6. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel I worin R¹ Wasserstoff,



X SO und Y Wasserstoff bedeuten, oder die physiologisch verträglichen Salze dieser Verbindung herstellt.

7. Verwendung von Verbindungen erhältlich gemäß Anspruch 1 als Reagenz.



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 470 616 A3**

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: **91113334.6**

Int. Cl.⁵: **C07D 239/42**

Anmeldetag: **08.08.91**

Priorität: **10.08.90 DE 4025387**

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
12.02.92 Patentblatt 92/07

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **25.03.92 Patentblatt 92/13**


Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT**
Postfach 80 03 20
W-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

Erfinder: **Geisen, Karl, Dr.**
Jahnstrasse 43
W-6000 Frankfurt a.M.(DE)
Erfinder: **Utz, Roland, Dr.**
Sudetenstrasse 18
W-6101 Messel(DE)

Erfinder: **Nimmesgern Hildegard, Dr.**
Rauenthaler Weg 32
W-6000 Frankfurt a.M.(DE)
Erfinder: **Lang, Hans-Jochen, Dr.**
Rüdesheimer Strasse 7
W-6238 Hofheim/Ts.(DE)

Substituierte Pyrimidin-Derivate, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Reagenzien.

Es werden Pyrimidin-Derivate der Formel I



I

worin R¹, R², X und Y die angegebene Bedeutung haben, deren Salze sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung beschrieben. Aufgrund ihrer sorbitakkumulierenden Aktivität eignen sie sich in ihrer Verwendung als Reagenzien für ein vorteilhaftes pharmakologisches Screening Modell bei der Prüfung von Aldose-Reduktase-Inhibitoren.

EP 0 470 616 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 11 3334

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	EP-A-0 198 583 (SMITH KLINE & FRENCH LABORATO- RIES) * Seite 9 - Seite 15; Ansprüche 13-16 ** -----	1	C 07 D 239/42
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			C 07 D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 20 Januar 92	Prüfer FRANCOIS J.C.L.
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</div> <div>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div>			